

REATTIVI - DIAGNOSTICI PER DIABETICI

L'erogazione è destinata alle persone affette da:

PATOLOGIA	Codice esenzione
Diabete Mellito	013
Iperinsulinismo	RCG060

Il numero di strisce reattive prescrivibili dipende:

- 1 nei soggetti in terapia con dieta, metformina, inibitori DPP IV, analoghi di GLP1, glitazoni, acarbosio non è dimostrata l'efficacia dell'autocontrollo glicemico, si può al massimo concedere la possibilità di un controllo a digiuno e uno post-prandiale a settimana (8 strisce mensili) tranne a quelli in terapia con sola dieta.
- 2 nei soggetti trattati con ipoglicemizzanti orali (sulfaniluree, glinidi) è indicato un profilo glicemico settimanale in quattro punti (16 strisce mensili).
- 3 nei soggetti in terapia combinata (insulina + compresse) è indicato un numero di controlli quotidiani pari al numero di iniezioni di insulina/die.
- 4 nei soggetti in terapia insulinica intensiva è indicato un numero di quattro controlli al giorno.
- 5 nelle donne con diabete gestazionale, la frequenza dell'autocontrollo, è decisa dal diabetologo in relazione alle singole situazioni.
- 6 nei soggetti con complicanze che rendono particolarmente pericolosi eventuali episodi ipoglicemici (coronaropatia, vasculopatia cerebrale, retinopatia proliferante) e che utilizzano ipoglicemizzanti orali (sulfaniluree o glinidi) sono indicati due controlli al giorno (max 60 strisce mensili).
- 7 nei soggetti in terapia con sulfaniluree, glinidi o insulina, in caso di malattie intercorrenti o condizioni di squilibrio glicemico, il numero di controlli è deciso, in deroga a quanto sopra descritto, dal diabetologo, che deve indicare il periodo di deroga. Il diabetologo si assume la responsabilità di motivare tale prescrizione, soggetta a controllo da parte delle Aziende Sanitarie

Modalità di spedizione/liquidazione

La ricetta, redatta dal medico curante, ai fini della spedizione/liquidazione deve necessariamente riportare il codice di esenzione per patologia nell'apposito riquadro.